

“
บุบบันนี่อย่างง่าย
มีสารอาหารที่เหมาะสม
และจำเป็นแก่ลูก
ทำให้ลูกเจริญเติบโตได้ดี
”

บุบบันนี่แบบแห่งประเทศไทย

อาคาร 904 ศูนย์การแพทย์และอนามัยในพระองค์

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ถนนสุขุมวิท เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร/แฟกซ์. 0-2241-7988

บุบบันนี่แบบแห่งประเทศไทย

อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 11

420/8 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2354-8404 แฟกซ์. 0-2354-8409



มูลนิธิศูนย์บันนี่แบบแห่งประเทศไทย



สสส
Thai Health

www.threibreastfeeding.org

www.facebook.com/Thaibf

ลูกหลุดหึง
กิบบมไม่พ่อ





ลูกhungดหงิด

กินนมไม่พอ

“
แม่ต้องสบใจ
การทำงานของลูกว่า
ลูกhungดหงิด
ด้วยเรื่องอะไร
”



เมื่อลูกมีอาการ hungดหงิด ร้องกวนในระยะที่ให้นมแม่ อาจทำให้คุณแม่ กังวลและเครียดมาก โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่ และเกรงว่านมแม่อาจไม่เพียงพอ กับความต้องการของลูก ทำให้ต้องเสริมนมผสม ในความเป็นจริง นมแม่นั้นย่อยง่ายและกระตุ้นการทำงานของระบบเผาอาหารและลำไส้ ทำให้เคลื่อนนมจากกระเพาะอาหารสู่ลำไส้ได้เร็วกว่านมผสม ดูดซึมน้ำนมจากลำไส้อายุร่วงเร็ว ทำให้ทารกบางรายอาจหิวปอย ซึ่งอาจทำให้ คุณแม่เข้าใจผิดว่าน้ำนมแม่ไม่พอ ทั้งๆ ที่ ลูกนั้นปัสสาวะได้บ่อย ถ่ายอุจจาระดี และน้ำหนักตัวขึ้นดี

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นที่อาจทำให้ทารก hungดหงิด ร้องกวน ตัวอย่าง เช่น หารกไม่สบายด้วยอาการศร้อนไป หนาวไป สมผัสกับอุณหภูมิ ปัสสาวะที่เปรอะเปื้อนผ้าอ้อม รู้สึกปวดท้อง หรือเหนื่อย ลมในกระเพาะอาหารมากเกินไป หรือได้ลมมากเกินไปจนท้องอืด ดังนั้นคุณแม่ควร ต้องรู้จักสังเกตอาการของลูกจากลักษณะท่าทาง การเสียงร้องว่าลูก hungดหงิด ร้องกวนนั้นเป็นจากสาเหตุดังกล่าวหรือไม่ ก่อนจะคิดว่าลูกหิว เพราะได้นมแม่ไม่พอ

หลักการพิจารณาว่าบันนมแม่อ้าวไม่พอ กับลูก

- ปัสสาวะสีเข้ม หรือน้อยกว่า 6 ครั้งต่อวัน
- อุจจาระแห้ง แข็ง
- ลูกดูดนมบ่อย ดูดนมนาน
- แม่ลองบีบหน้านมได้ไม่มาก
- ลูกน้ำหนักขึ้นไม่ดี โดยคร่าวๆ ลูกควรมีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักแรกเกิดภายใน 10 วัน หรือมีน้ำหนักขึ้นประมาณอย่างน้อย 500 กรัมต่อเดือน

ดังนั้นคุณแม่เมื่อคุณพิจารณาให้นมผสมเสริม หากพิจารณาแล้วว่าลูกไม่ได้มีปัญหาดังกล่าว เพราะการเข้าใจว่านมแม่ไม่พอ และ เสริมนมผสมโดยเฉพาะให้ดูดจากขวดนม อาจทำให้ลูกติดขวดนม และไม่สนใจดูดนมแม่ และhungดหงิดมากขึ้นขณะให้นมแม่ได้ และ ยังทำให้บริโภคน้ำนมของคุณแม่ลดลง เนื่องจากลูกดูดนมแม่น้อย และไม่ปอยเท่าที่ควร

โดยสรุปควรให้นมแม่ปอยเท่าที่ต้องการ นมแม่นั้นย่อยง่าย และมีสารอาหารที่เหมาะสมและจำเป็นแก่ลูก ทำให้ลูกเติบโตได้ดี การที่ลูกหิวปอยขณะให้นมแม่นั้นเป็นปกติได้ ตราบใดที่พิจารณาดังกล่าวแล้วว่าลูกมีการเจริญเติบโตที่ดี

ข้อมูล : วศ.นพ.ประชา นันท์กุมิตร