



“กาม-ตอบ” เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ตอน.....เมื่อยูในโรงพยาบาล

สำหรับ.....แม่ ผู้ที่กำลังจะเป็นแม่และคนสำคัญพ่อ





จាหน่ายสำหรับ แม่ผู้มาฟากครรภ์
มาคลอด ในสถานพยาบาล

ราคาพิเศษ 10 บาท



เจ้าของ

สมาคมกุ珥แพทย์แห่งประเทศไทย

พิมพ์ครั้งที่ 2

E-mail : pediatric@asiaaccess.net.th

วันที่ 15 มีนาคม 2547

จำนวน

10,000 เล่ม

บรรณาธิการ

ฤทธิ์ ชูศิลป์

กรรณิการ์ บางสาียนน้อย

ISBN

974-7068-90-7

ราคา 20 บาท

หนังสือชุดนี้ มี 3 ตอน

1. ตาม-ตอบ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตอน ก่อนคลอด
2. ตาม-ตอบ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตอน เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล
3. ตาม-ตอบ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตอน เมื่อกลับบ้าน



“ตาม-ตอบ” เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ชุดที่ 1

2





“ตาม-ตอบ” เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ชุด 1 ตอน....เมื่ออยู่ในโรง
พยาบาล คงได้ช่วยแม่ ผู้กำลังจะเป็นแม่... รวมทั้งพ่อ ตลอดจนผู้
สนใจ... ให้เข้าใจ มั่นใจ ใน การช่วยให้ลูกได้กินนมแม่...ของวัณ്ണแรก
แห่งชีวิตลูก ขอบคุณ คุณศุ บุญเลี้ยง ผู้ประพันธ์เพลงอิมคุ่น ที่
อนุญาตให้ตีพิมพ์บทเพลง ขอบคุณคลินิกนมแม่ ของหน่วยงานต่างๆ
ดังรายการข้างล่าง ที่กรุณาส่ง คำถาย-คำตอบจริง มาร่วมลงใน
หนังสือชุดนี้ด้วย

รศ.พญ. คุณหญิงสาวารี จิตตินันทน์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วีระพงษ์ ฉัตรานนท์



รพ.ศิริราช
สถาบันบำราศนราดูร ถนนทบูรี
รพ.วิชัยยทธ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม.
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
โรงพยาบาลบ้านบึง ราชบูรี
โรงพยาบาลขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โรงพยาบาลเดลิดิน
รพ.สมิติเวช ศูนย์วิทยุ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบูรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบูรี
โรงพยาบาลศุนย์เจ้าพระยาymราช ศุพรรณบูรี
โรงพยาบาลศรีคริรัตน์
โรงพยาบาลมหาสารคาม

พิมพ์ที่ กรุงเทพเวชสาร
โทร. 0-2258-7954

ตอน เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล





ขอขอบคุณ

ชมรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ราชวิทยาลัยสุติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย
คลินิกนัมแม่ โรงพยาบาลศิริราช
และคลินิกนัมแม่ โรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่
ที่เป็นต้นแบบของการให้คำปรึกษา
และแก้ไขปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

และ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่สนับสนุนการจัดทำ



คณะกรรมการ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
สมาคมกุฎารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน

รศ.พญ. คุณหญิงสาว hairy จิตตินันทน์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วีระพงษ์ ฉัตรวนนท์
ศ.นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
ผศ.พญ.กุสما ชูศิลป์
พญ.กรรณิการ์ บางสายน้อย¹
รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรรุณิ
พญ.รัตน์ทัย พลับรุ้งการ
พญ.นิพรรณพร วรรณมงคล
พญ.ศิริพัฒนา ศิรินารัตนกุล
พญ.ศิราภรณ์ ลวัสดิวร



“กาม-ตอบ” เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ชุดที่ 1





เจตนา湿润 สมุดกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนกิจกรรมดังนี้

- ✓ ภูมิประเทศช่วยให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ตั้งแต่แรกเกิด
- ✓ แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4-6 เดือนและให้นมแม่ต่อควบคู่กับอาหารที่เหมาะสมตามวัยจนเข้าขวบปีที่ 2
- ✓ กิจกรรมตามแนวทางบันได 10 ขั้น ขององค์กรอนามัยโลก ในเรื่องพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกต่างๆ
- ✓ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารหารากและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- ✓ สถานที่ทำงานจัดสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน จัดสถานที่บีบีนม และอนุญาตให้แม่มาให้นมลูกหรือพักบีบีนม เพื่อให้แม่ที่ครบกำหนดลักษณะสามารถให้นมแม่แก่ลูกได้ต่อเนื่อง
- ✓ มีการปฏิบัติตามระเบียบการลากคลอดของข้าราชการลูกจ้างประจำคือ ลากคลอดได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือน และมีสิทธิลาต่อเพื่อเลี้ยงบุตรได้อีกไม่เกิน 150 วัน โดยไม่รับเงินเดือน
- ✓ ลูกจ้างได้รับการลาตามกฎหมายแรงงานอย่างจริงจัง คือลากคลอดได้ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง 45 วัน และจากประกันสังคม 45 วันต่อมา
- ✓ บริษัท ห้างร้าน ที่สาธารณชน มีมุ่งที่แม่สามารถจะให้นมลูกได้อย่างสงบหรือ สามารถนั่งพักบีบีนมได้
- ✓ โรงพยาบาลมีการช่วยเหลือให้ทารกที่ป่วยรวมทั้งทารกที่คลอดก่อนกำหนด ได้รับนมแม่ ตลอดจนมีผู้ให้คำปรึกษาปัญหาจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ตอน เมื่อยี่นร่องพยาบาล



5





“ການ-ຕອບ” ເສັ້ນສູກຕ້ວຍນມແມ່ ບຸດກີ່ 1

6





“กาม-ตอบ” เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ตอน...เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล



ตอน เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล



7





ถาม : ทำไมต้องให้ลูกกماอยู่กับแม่ตั้งแต่ในห้องคลอดทั้งๆ ที่แม่รู้สึกเหนื่อยจากการคลอด

ตอบ : การเริ่มให้อาหารเด็กบากดลูกเนื้อแนบเนื้อ ให้ลูกได้ดูดนมแม่ตั้งแต่หลังคลอดทันที จะช่วยกระตุนฮอร์โมนที่ทำให้มดลูกหดตัว ลดการเสียเลือด รวมทั้งฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมทำให้น้ำนมมาเร็วขึ้น ระยะเกิดใหม่ๆ หากจะตื่นตัวดี การได้สัมผัสกับแม่จะช่วยให้เกิดการเริ่มต้นของความรักความผูกพันที่ดีและยั่งยืน



ถาม : น้ำนมนาน้อยหลังคลอด 2 วัน จะทำอย่างไร

ตอบ : ในระยะ 1-2 วันแรก หลังคลอดน้ำนมมาน้อยเป็นเรื่องปกติ ให้ลูกดูดนนมแม่ให้บ่อยๆ วันละ 8-12 ครั้งหรือมากกว่า จะช่วยให้น้ำนมมาเร็ว เวลาให้ลูกดูดนนมบ่อยๆ ต้องดูให้ถูกวิธี คุ้มลูกให้ถันดี ร่วมกับแม่กินอาหารและน้ำให้เพียงพอ และพยายามตัดความกังวลใจ เพราะความกังวลใจทำให้น้ำนมมาช้า



“ถาม-ตอบ” เสี่ยงลูกตัวยอมแม่ ชุดที่ 1





ถ้า : ให้ลูกดูดอย่างถูกวิธีและอุ้มลูกให้ถันดัด หมายความว่าอย่างไร

ตอบ : ดูดถูกวิธี คือ omnให้ลึกถึงลานหัวนม ลูกเข้าปากกริ่งคางชิด หรือเกือบชิดเต้านม ริมฝีปากไม่เม้มไม่น่อ อุ้มลูกให้ถันดัด คือจัดท่าให้ลูกกินนมแม่ในท่าสบายนั่งแม่และลูก เช่น ให้แม่นั่งสบายนมมีหมอนพิงไม่เค็งหลังจนเกินไป อาจใช้มอนรองลำตัวลูกเพื่อช่วยให้ปากลูกอยู่ในระดับเดียวกับเต้านมแม่เวลาลูกกินนมจะได้ไม่ต้องเอ่น หรือแหงนคอคุดนมวิธีดูด และการจัดท่าเช่นนี้ จำเป็นต้องเน้นในช่วงเกิดใหม่ๆ เมื่อลูกโตขึ้น แม่ลูกแต่ละคนจะมีท่าของตัวเอง ที่อาจไม่เหมือนที่กล่าวก็ได้



ถ้า : การให้กินนมแม่ต้องกำหนดเวลา กินหรือไม่

ตอบ : การกินนมแม่ไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลา โดยธรรมชาติลูกจะเป็นคนกำหนดเองว่าจะกินเมื่อไร แต่การที่ต้องให้ลูกดูดบ่อย 8-12 ครั้งในระยะแรกๆ หลังคลอด ที่น้ำนมยังมาน้อย เป็นการกระตุนที่เปรียบเหมือนการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติด ซึ่งมักจะติด คือน้ำนมมาประมาณวันที่ 2-3 หลังคลอด ถ้าน้ำนมมาแล้วคุณแม่ก็ให้ลูกดูนม เมื่อลูกหิว หรือตามที่ลูกต้องการ

ตอบ เมื่อยี่นร่องพยาบาล





กาม : ลูกเหว่วนม หลังดูดนมผิดปกติหรือไม่

ตอบ : การเหว่วนมไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ในระยะที่ลูกเกิดใหม่ๆ การดูด และการกลืนของลูกอาจยังไม่เป็นด้วยกันดี หูฉุดกระเพาะอาหารยังไม่แข็งแรง หลังกินนม น้ำนมจึงอาจเหมือนกระชากออกอกรมา ถ้าลูกยังคงดูด นมดีไม่ซึม ไม่เป็นไร แต่ถ้าลูกเหว่วนมแล้วซึม งอเง ไม่ยอมดูนม นั่นจึงผิดปกติ



กาม : หลังคลอด 2 วันยังไม่รู้สึกดัดเต้านมและน้ำนม ก ยังไม่ไหลด้วย จะรู้ได้อย่างไรว่ามีน้ำนมอยู่จริง

ตอบ : หลังคลอด 2 วันน้ำนมอาจยังไม่ไหลให้เห็น ถ้าต้องการให้เห็นกับตาว่ามีน้ำนม คุณแม่ควรลองบีบยำๆ บริเวณลานหัวนมโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือว่างที่ขอบนอกของลานหัวนม แล้วดันเข้าหาตัวแม่เอง ปีบ ชี้หอยๆ ครั้งเป็นจังหวะ น้ำนมจะซึมออกมากแสดงให้เห็นว่ามีน้ำนมอย่างแน่นอน



“กาม-ตอบ” เสียงสุกด้วยนมแม่ ชุดที่ 1





ถาม : ลูกแรกเกิดมีปัญหาปากแหว่ง เพดานโพห์สามารถดูดนมแม่ได้หรือไม่

ตอบ : ส่วนใหญ่สามารถดูดนมแม่ได้ แต่ต้องได้รับการผ่าฟัน เทคนิคการช่วยเหลือเบื้องต้นจากผู้มีความชำนาญ โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการสำลัก เช่น การจับศีรษะ ลูกให้สูงกว่าลำตัว และแม่ให้มือช่วยบีบหน้ามเป็น จังหวะขณะดูดอย่างช้าๆ หากมีน้ำนมไหลขึ้นทางจมูก ลูกไข้เวลาดูดนมนาน หรือเหวอะนมค่อนข้างมาก ควรปรึกษาแพทย์



ถาม : ทำไมหลังให้ลูกกินนมแม่แล้วไม่แน่นำให้ป้อนน้ำตาม

ตอบ : ในน้ำนมแม่มีน้ำเพียงพอแล้ว ในระยะลูกยังเล็กๆ โดยเฉพาะแรกเกิดถึง 6 เดือน กระเพาะยังมีขนาดเล็ก การได้น้ำจะไปแบ่งที่น้ำนมแม่ ทำให้ได้นมแม่น้อยลง เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราอยากรักลูกได้น้ำนมแม่ ให้มาก ปัจจุบันมีข้อสรุปแล้วว่าน้ำนมแม่เป็นอาหาร สมองที่ดีที่สุด ลูกระยะนี้สมองกำลังโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องเน้นให้ได้รับน้ำนมแม่อย่างเดียว

ตอบ เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล





ถาม : ต้องเข็คทำความสะอาดหัวนมทุกครั้ง ก่อนให้ลูกดูดนม หรือไม่

ตอบ : ไม่จำเป็น การเข็คหรือทำความสะอาดบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการใช้สบู่ จะล้างน้ำมันหรือรرمชาติที่เคลือบอยู่บริเวณหัวนมและลานหัวนมออกไป ทำให้แห้งและแตกง่าย การอาบน้ำตามปกติเท้าเย็น ก็เพียงพอแล้ว

ถาม : ลูกอายุได้ 5-6 วัน ขณะให้ลูกดูดนนมรู้สึกเจ็บหัวนม เป็นเพราะอะไร

ตอบ : สาเหตุที่พบบ่อยคือให้ลูกดูดนไม่ลึกถึงลานหัวนมลูกดูดได้เฉพาะบริเวณหัวนม ซึ่งมีเนื้อเยื่อบางมากและเส้นประสาทที่ไวมาก แม้จังรู้สึกเจ็บ ขณะให้ลูกดูดถัยังคงให้ดูดเช่นนี้ต่อจะเกิดแผลได้ ซึ่งยิ่งทำให้เจ็บมากขึ้น ลองปรับโดยให้ลูกดูดนให้ลึกพอก และจัดท่าอ้อมให้ถันด อาการเจ็บจะลดลงหรือหายไป ถ้าไม่ดีขึ้นควรปรึกษาคลินิกน姆แม่



“ถาม-ตอบ” เสียงลูกตัวยนต์ ชุดที่ 1





ถาม : แม่หัวนമแตกเป็นแผ่น เจ็บมาก ต้องหยุดให้นมแม่หรือไม่

ตอบ : ไม่จำเป็นต้องหยุดให้นมลูก ให้แม่ปรับการดูดนมให้ลูกต้อง และอาจต้องเปลี่ยนท่าอุ้ม เพื่อให้ลูกได้เปลี่ยนที่รับelanหัวนม ไม่งับบริเวณที่เป็นแผ่น แต่ถ้าเจ็บมากจนทนไม่ได้ อาจหยุดให้ข้างที่เจ็บชั่วคราว แต่ให้บีบัน้ำนมข้างนั้นออกทุก 3 ชม. เพื่อคงสภาพน้ำนมไว้ เมื่ออาการเจ็บทุเลา จึงกลับให้ดูดนมข้างนั้นต่อไป



ถาม : เมื่อเกิดปัญหาหัวนมแตก จะใช้เทคนิคการดูดนมให้ลูกต้องอย่างไร

ตอบ : เปลี่ยนรอยจับไม่ให้ลูกดูดร้อยเดิม โดยลองอุ้มลูกดูดนม แม่กลับทิศทางจากท่าเดิม เวลาจะให้นมลูก ก็ให้ใช้วิธีเขี่ยริมฝีปากลูก จนลูกข้าบปากกว้างเดิมที่ (ดังรูปปัก) แล้วเคลื่อนลูกเข้าหาเต้านมโดยเร็วและให้มากพอก เพื่อให้อุ้มน้ำนมและลานหัวนมได้ลึกพอกล้าทำเช่นนี้เมื่อลูกเริ่มดูด หัวนมจะถูกดึงยึดยาวไปบนลิ้น อยู่ระหว่างลิ้น และเพดานปาก แม่จะเจ็บในระยะแรก เมื่อดูดต่อไปจะเจ็บน้อยลง

ตอบ เมื่ออุ้มน้ำนมพยาบาล





ถาม : ลูกดูดนมแล้วปั่นอย เหมื่อนดูดหัวนมไม่ได้ เป็น เพราะอะไร จะแก้ไขอย่างไร

ตอบ : เป็นเพราะลูกดูดแต่บริเวณหัวนม จึงไม่ได้รับน้ำนม ถ้าเป็นเช่นนี้ก็แก้ไขโดยปรับการออมหัวนมใหม่ ที่พบได้ อีกสาเหตุหนึ่งคือ ลูกมีภาวะลิ้นติด คือมีเหมือน พังผืดบางๆ ยึดโคนลิ้น ทำให้ลิ้นยื่นออกมากวัดหัวนม ไม่ได้ดี ถ้าเป็นเช่นนี้ควรปรึกษาคลินิกนัมแม่



ถาม : เพื่อนที่เคยมีลูกมาก่อนเล่าว่า กว่าหัวนมแม่จะมา ต้องใช้เวลาถึง 2-3 วัน ในระยะนี้จะป้อนอะไร ลูกดี

ตอบ : ในระยะ 2-3 วันแรกหลังคลอดที่เข้าใจว่าหัวนมไม่มาก อาจเป็นความเข้าใจที่ผิด ลองปฏิบัติตามข้อแนะนำ ข้างต้นดูก่อน อาจจะพบว่าหัวนมมากแล้วแต่ mana อยู่ เพราะเป็นระยะหัวนม ถ้าน้ำนมมาแล้วก็ให้กินนม แม่ไม่จำเป็นต้องป้อนอาหารอื่น



“ถาม-ตอบ” เสียงลูกตัวยับแม่ ชุดที่ 1





หมายเหตุ : ถ้าจะเสริมนมผงสมให้ลูกในระยะหลังเกิด 2-3 วัน
แรกนี้ จะเกิดอะไรกับลูกบ้าง

ตอบ : การให้นมผงสมเสริมในระยะนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ที่ดูแลเด็ก โดยทั่วไปนมแม่มีเพียงพอ ถ้ามีการเสริมให้โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ จะมีข้อเสียที่ควรคิด 4-5 ประการ

- ♥ ถ้าให้นมผงสม ลูกยื่อมดูดนนมแม่น้อยลง น้ำนมแม่ก็จะสร้างน้อยลงฯ จนหมดไปได้
- ♥ ลูกไม่ได้รับหัวนม ซึ่งมีภูมิคุ้มกันชนิดเข้มข้นช่วยป้องกันการติดเชื้อในลูก
- ♥ การได้นมผงสมทำให้ลูกติดหัวนมยางและอาจดูดนมแม่ไม่เป็น
- ♥ การซั่งนม ขาดนมอาจปนเปื้อนเชื้อโรค ลูกมีโอกาสท้องเสียเพราะติดเชื้ออื่นๆ ได้
- ♥ ลูกมีโอกาสแพ้โปรตีนของนมวัวซึ่งนับว่าเป็นโปรตีนแปรกปลอมสำหรับลูกคน



ตอน เมื่อยี่นีรองพยาบาล





ถาม : ทำไมการได้รับนมผสมในระยะนี้ จึงทำให้ลูกมีโอกาสเกิดปัญหาภูมิแพ้ได้

ตอบ : ระยะนี้เยื่อบุลำไส้ไม่แข็งแรง น้ำย่อยยังไม่พร้อม การได้รับนมผสมซึ่งมีโปรตีนของวัว มีโอกาสทำให้ลูกเกิดอาการแพ้ และเป็นโรคภูมิแพ้ได้ ลูกไม่แพ้นมแม่ เพราะโปรตีนในนมแม่ เป็นโปรตีนของคน ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอม สำหรับทารกที่มีกรรมพันธุ์ เช่น มีพ่อแม่เป็นโรคภูมิแพ้ ยิ่งต้องให้ลูกกินนมแม่ เพราะจะได้รับนมที่จำเพาะต่อลูกคน มีการศึกษาจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่า ทารกที่กินนมแม่มีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังน้อยกว่า 2-7 เท่า



ถาม : ลูกมีน้ำหนักแรกเกิด 3 กก. พอกายุ 5 วัน น้ำหนักลูกหายไป 1 ชีด เหลือ 2.9 กก. ผิดปกติหรือไม่ และให้กินนมแม่อย่างเดียวจะยังพอไหม

ตอบ : ไม่ผิดปกติ ทารกจะมีน้ำหนักลดลงในสัปดาห์แรกเนื่องจากมีการทยอยขับน้ำส่วนที่มีอุ้ยในร่างกาย ออกมากทางปัสสาวะ น้ำหนักจึงมักลดลง แต่จะลดลงไม่เกินร้อยละ 10 ของน้ำหนักแรกเกิด กรณีนี้น้ำหนักลดลงเพียงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 3-4 การได้รับน้ำนมแม่อย่างเดียวยังเพียงพอ



“ถาม-ตอบ” เสี่ยงสูกตัวยนต์แม่ ชุดที่ 1





ถาม : สังเกตเห็นลูกอายุ 5 วัน มีตัวเหลืองจึงพาไปโรงพยาบาล ระหว่างส่องไฟประมาณ 2 วัน ครรให้ลูกกินน้ำมากขึ้นหรือไม่

ตอบ : นำ้มแม่ปอกติมีน้ำเพียงพอ กับความต้องการของลูกไม่จำเป็นต้องกินน้ำเพิ่มขึ้น ครรให้กินนมแม่นานขึ้น และบ่อยมากขึ้น แต่เดิมแนะนำให้ลูกกินน้ำมากๆ เพราะเชื่อว่าสารสีเหลืองถูกขับออกทางปัสสาวะเป็นหลัก แต่ปัจจุบันพบว่าร้อยละ 80 ของสารสีเหลืองถูกขับออกทางอุจจาระ การดูดนมที่ภูมิคุ้มกันจะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ ทำให้สารสีเหลืองถูกขับออกไปกับอุจจาระได้เร็วขึ้นและลดระยะเวลาการส่องไฟได้มาก



ถาม : ถ้าให้ลูกดูดน้ำหรือนมจากขวดขณะอยู่ในโรงพยาบาลจะมีผลกับการให้นมแม่หรือไม่

ตอบ : การดูดน้ำหรือนมจากขวด จะทำให้ลูกเกิดความสับสนกับการดูดนมแม่จากเต้า เนื่องจากกลไกการดูดแตกต่างกัน เมื่อลูกกลับมาดูดนมแม่จะใช้วิธีการดูดเช่นเดียวกับหัวนมยาง คืองับบริเวณหัวนมมากกว่าอมให้ลึกถึงลานหัวนม ทำให้แม่รู้สึกเจ็บ ก่อให้เกิดปัญหาหัวนมแตก น้ำนมออกน้อยและแห้งหมดไปได้ในที่สุด

ตอน เมื่อยู่ในโรงพยาบาล





gam : ลูกอายุ 3 วันกินนมแม่ ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าลูกจะได้นมแม่เพียงพอ

ตอบ : เป็นเรื่องธรรมชาติที่แม่มากจะไม่ค่อยมั่นใจว่าลูกได้นมแม่เพียงพอ เพราะการกินนมแม่ไม่สามารถมองเห็นหรือวัดตัวง่ายได้เป็นเช่นไร เราจึงว่าลูกได้รับนมแม่เพียงพอโดยสังเกต

♥ ลักษณะอุจจาระ ระยะ 2-3 วันแรกถ่ายเป็นขี้เทา พอเข้าวันที่ 4-5 เปลี่ยนเป็นอุจจาระสีออกเหลือง โดยถ่ายอุจจาระวันละประมาณ 4 ครั้งขึ้นไป

♥ ปัสสาวะ อย่างน้อยวันละ 6 ครั้งขึ้นไป

♥ ลูกดูมีความสุข หลับสบายหลังกินนมแม่

ในทางกลับกันถ้าในวันที่ 4-5 ลูกยังคงถ่ายเป็นสีออกน้ำตาล đậm ของขี้เทา แสดงว่าลูกอาจได้น้ำนมแม่ไม่พอ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่าย ซึ่งต้องให้ การดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้นถ้าเกินวันที่ 5 ยังคงถ่ายเป็นขี้เทา ต้องปรึกษาแพทย์



“gam-ตอบ” เสียงลูกตัวยนต์ บุ๊คที่ 1





ถาม : ลูกเกินน้ำนมแม่ อายุ 3 วัน ถ่ายบ่อย วันละ 7-8 ครั้ง ผิดปกติหรือไม่

ตอบ : ลูกอายุ 3 วัน น้ำนมแม่ยังอยู่ในระยะหัวน้ำนม หัวน้ำนมมีถูกทึบเป็นเหมือนยาวยาอยู่อ่อนๆ จึงทำให้ลูกถ่ายบ่อย ซึ่งเป็นข้อดี ช่วยขับสารสีเหลืองออกจากร่างกายลูกด้วยและเป็นข้อเด่นของการให้น้ำนมแม่ ซึ่งไม่พบในการให้น้ำนมnidอื่น



ถาม : คุณหมอบอกว่าหัวน้ำนมมีประโยชน์ต้องให้ลูกได้กิน แต่มีน้อยจังเลยจะเพียงพอหรือ

ตอบ : หัวน้ำนม (คลอสตรัม) มีน้อยจริงในวันแรกๆ ถ้าลูกดูดบ่อยๆ หัวน้ำนมก็จะมีมากขึ้นเอง ถ้าดูความต้องการของทารกแรกเกิด พบร่วงทารกแม่ได้รับน้ำนมเพียงประมาณ 6-12 ซีซี ต่อเมื่อ ใน 1-2 วันแรก และลูกได้ดูดบ่อย 8-10 ครั้ง ลูกก็จะได้รับน้ำนม วันละ 60-120 ซีซีต่อวัน ถ้าจะมีการขาดไปบ้าง ทารกปกติจะมีอาหารและพลังงานสำรองเพียงพอ จึงควรมั่นใจให้ทารกได้รับน้ำนมแม่ อย่าเพิ่งนำนมผสมมาให้ เพราะจะเกิดผลเสีย



ตอน เมื่อยุ่นโรงพยาบาล





ภารกิจ : เดย์ไปเยี่ยมพี่สาวที่โรงพยาบาล พี่สาวเด้านมคัดมากจนแข็ง และเจ็บมาก ตอน 3 วันแรกหลังให้กินนมแม่น่ากลัวจัง ไม่อยากเป็นแบบนั้นจะทำอย่างไร

ตอบ : เด้านมคัด ในระยะ 2-3 วันแรกที่เริ่มให้นม พบได้บ่อย ส่วนใหญ่จะเป็นคัดแบบที่เรียกว่าเด้านมเต็มตึง ซึ่งเป็นธรรมชาติของช่วงที่น้ำนมกำลังมาใหม่ๆ แม่อาจเจ็บบ้างแต่ไม่มากและเมื่อให้ลูกดูดนนม น้ำนมก็ไหลดี แต่ถ้าเด้านมคัดแข็งร่วมกับอาการปวดมากเช่นนี้ อาจเป็นผลจากน้ำนมคั่งมากเกินไป พบในกรณีที่น้ำนมมาแล้ว ลูกดูดราบ牙อยู่ก็ไม่ทัน แรงดันในเด้านมสูง จึงเกิดการบวม เจ็บมาก การป้องกันที่สำคัญคือ ให้ลูกดูดนนมให้ถูกวิธี อุ้มลูกให้ถนัดและที่สำคัญคือให้ลูกดูดนนมบ่อยๆ เพื่อเป็นการระบายน้ำนมออกจะบรรเทาอาการปวด



“ภารกิจ-ตอบ” เสี่ยงลูกตัวยอมแม่ ชุดที่ 1





案例 : มีลูกแพด 2 ให้ลูกกินนมแม่จะพอหรือ

ตอบ : การสร้างน้ำนมขึ้นกับการดูดของลูก ธรรมชาติสร้างลูกแพดได้ ธรรมชาติถือสามารถให้เต้านมแม่ผลิตน้ำนมได้พอ ถ้าลูกได้ดูดนมแม่พร้อมๆ กันทั้ง 2 คน น้ำนมก็จะมีการสร้างมากและออกมากมากทั้ง 2 เต้า แต่ถ้าได้ให้ดูดอย่างเดียวที่แล้วน้ำนมยังไม่พอ ลูกมีอาการหิว แสดงว่าได้รับน้ำนมไม่เพียงพอ ก็อาจต้องช่วยเสริมน้ำนมผสานบ้างเป็นกรณีไป



案例 : ลูกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อย คลอดก่อนกำหนดน้ำหนักประมาณ 1,900 กรัม ยังไม่แข็งแรง ดูดนมแม่ไม่ได้ จะต้องให้นมผสานเสริมหรือไม่

ตอบ : ปัจจุบันมีวิธีการสอนให้แม่บีบนำนมเก็บไว้ให้ลูก ส่งให้เจ้าหน้าที่ป้อนให้ลูกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทางหลอดหยด สายยาง หรือทางถ่ายแก้ว และค่อยๆ ฝึกให้ลูกได้ดูดนมจากเต้าเมื่อลูกแข็งแรงขึ้น ดังนั้นแม่ลูกจะน้ำหนักน้อยหรือเกิดก่อนกำหนด ก็สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้น้ำนมแม่อย่าง่าย ลูกจะแข็งแรงทั้งยังมีภูมิคุ้มกันโรค และน้ำหนักนักขึ้นได้เร็วอีกด้วย

ตอน เมื่อยู่ในโรงพยาบาล





หมาย : บางโรงพยายาบาลหลังคลอดแล้วจะให้แม่และลูกนอนอยู่ด้วยกันตลอด แต่บางโรงพยายาบาลจะแยกลูกไปเลี้ยงให้โดยเฉพาะตอนกลางคืน เพื่อให้มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ

ตอบ : การให้แม่และลูกอยู่ด้วยกันตลอดจะทำให้แม่และลูกได้เรียนรู้กันเร็ว แม่จะรู้สึกภูมิใจที่ลูกแสดงออก เช่น จะตื่น จะกิน การรู้ความต้องการของลูก ทำให้ตอบสนองได้ทัน ลูกได้ดูคนมแม่ทัน แต่ถ้าแยกลูกออกจาก มา เวลาเริ่มส่งสัญญาณ จะตื่น จะกิน ผู้ดูแลห้องเด็กมากไม่มีเวลาพอยที่จะสังเกตเห็น ทำให้ลูกต้องร้องเมื่อร้องลูกก็เริ่มมีอารมณ์หงุดหงิด บางครั้งก็ปฏิเสธไม่กินนม นอกจานน้ำลูกก็คงต้องได้รับนมสด ซึ่งไม่เป็นข้อดีต่อลูก การแยกลูกจึงอาจมีข้อดีที่แม่ได้พักแต่ก็มีข้อเสียหลายประการ เด็กวัยนี้ การตอบสนองทางอารมณ์ ทางร่างกายอย่างทันท่วงที และเหมาะสม เป็นการสร้างพื้นฐานทางด้านอารมณ์และจิตใจที่สำคัญ



“หมาย-ตอบ” เลี้ยงลูกตัวยนต์แม่ ชุดที่ 1





ถาม : ถ้าแม่ไม่สบายมีไข้หลังคลอด ต้องหยุดให้นมแม่หรือไม่

ตอบ : ไม่ต้องหยุดให้นมแม่เมื่อมีไข้สบายเล็กๆ น้อยๆ เช่น มีไข้หวัด ท้องเสีย เป็นผื่น การให้ลูกดูดนนมแม่จะเป็นการป้องกันลูกจากการติดเชื้อ โดยเชื้อโรคที่เข้าสู่ตัวแม่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิต้านทานในน้ำนมแม่และส่งผ่านมาให้ลูกได้ ในบางกรณีถ้าลูกเกิดเจ็บป่วยโรคเดียวกับที่แม่เป็น ลูกมักจะมีอาการไม่น่ากิน เพราะได้ภูมิต้านทานต่อเชื้อนั้นจากแม่



ถาม : แม่กินยา ต้องหยุดให้ลูกกินนมแม่หรือไม่

ตอบ : โดยทั่วไป ยาที่แม่กินหรือขึ้นใจจะออกมากทางน้ำนมในปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณยาที่แม่ได้รับ จึงไม่ต้องกังวลใจ ดังนั้น ไม่ควรหยุดให้ลูกกินนมแม่แต่เพื่อให้มีผลต่อลูกน้อยที่สุด ขอแนะนำดังนี้

- ♥ ใช้ยาต่างๆ ในระยะเวลาสั้นเท่าที่จำเป็น ถ้าต้องใช้นานควรปรึกษาแพทย์
- ♥ ให้ลูกกินนมแม่ให้อิ่มแล้วจึงกินยา หรือเลือกกินยาในช่วงลูกหลับยาม เมื่อถึงเวลาที่ลูกจะดูดนนมมื้อต่อไป ก็จะเป็นช่วงที่ระดับยาลดลงมากแล้ว

ตอบ เมื่อยี่นีรองพยาบาล





ภารม : ในช่วงที่ลูกกินนมแม่ มียาอะไรบ้างที่ห้ามใช้หรือต้องระวัง

ตอบ : ยาที่ห้ามใช้มีเมื่อไหร่ก็นิด ยาเหล่านี้คุณแม่มีโอกาสให้น้อยมาก ได้แก่ ยา_rักษาภาวะเริง สารกัมมันตรังสี ยา_rักษาไม่เกรนประเทท ergotamine ยา กันเลือดแข็งตัวบางชนิด ส่วนยาสามัญ เช่น ยาแก้ปวดพาราเซตามอล, ยาอม็อกซี แก้อักเสบ, ยาแก้หวัด, ยาแก้ไอ คุณแม่ใช้ได้ มีเมื่อไหร่ก็นิดที่ต้องระมัดระวังเวลาใช้เพราะอาจมีผลข้างเคียงต่อลูก ได้แก่ ยาขัดฟากบางชนิด เป็นต้น ยาเหล่านี้แพทย์จะหลีกเลี่ยงไม่ส่งให้แม่ที่ให้นมลูกอยู่แล้ว



“ภาร-ตอบ” เสี่ยงลูกตัวยอมแม่ บุคก์ 1





ตอน เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล



25





ຄລົມ

ກຽງເທິພາບາລຸນທຸງ

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງ ໂທຣ. 0-2419-7000 ຕ່ອ 5994, 5995

ສຕາບັນສຸຂາພເດັກແໜ່ງຊາດີມໝາຮາຈືນ (ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງ) ໂທຣ. 0-2246-1260-6 ຕ່ອ 5002
0-2354-8945

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງປະຈຳວັດຖາ ໂທຣ. 0-2289-1153-5, 0-2289-1157-8
0-2292-1848-51

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງຈົມ ໂທຣ. 0-2248-3213-4

ສຕາບັນນຳຮາສານຈາດູຮ ນນທຸງ ໂທຣ. 0-2591-1168-79

ວິທາຍາລັບແພທຍາສັດຖິ ກຽງເທິພາບາລຸນທຸງ ໂທຣ. 0-2241-2738

ສູນຍົ່ນນຳມັຍ ທີ່ 1 ບາງເຂົນ ກຽງເທິພາບາລຸນທຸງ ໂທຣ. 0-2521-3056-64-6

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງມືພລ ໂທຣ. 0-2531-1970-90

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງສົມຕິເວັບ ສູ່ມົງວິທ ໂທຣ. 0-2711-8000, 0-2392-0011 ຕ່ອສູນຍົ່ນນຳມັຍ

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງໄກ 2 ໂທຣ. 0-2270-1502

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງລົງຍຸທອ ໂທຣ. 0-2618-6200-19

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງລາງ ໂທຣ. 0-2221-6141

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງສິນ ໂທຣ. 0-2437-0123-30

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງພ້ອງທີ່ສັກດີ ຊຸດິນອີຣ ອຸທິສ ໂທຣ. 0-2429-3574-81

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງພວັດນໍາຈານ ໂທຣ. 0-2517-4270-9 ຕ່ອແຜນກສາຍສົ່ມພັນນີ້ແມ່ຈຸກ

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງຫອງຈອກ ໂທຣ. 0-2988-4097-8, 0-2543-1307, 0-2543-1150

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງເດີດສິນ ໂທຣ. 0-2353-9799

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງລາດກະບັງ ໂທຣ. 0-2326-9995, 0-2326-7711

ໂຮງພຍາບາລຸນທຸງເຊັນຕົ້ນຫຼຸຍສ ໂທຣ. 0-2675-5000, 0-2210-9999 ຕ່ອ 10225-6

ຕ່າງຈັງຫວັດ

ສູນຍົ່ນນຳມັຍ ທີ່ 4 ຈັງຫວັດຮາສຸງ ໂທຣ. 0-3233-7509, 0-3231-0368


ສູນຍົ່ນນຳມັຍ ທີ່ 5 ຈັງຫວັດນໍາຈານສື່ມາ ໂທຣ. 0-4430-5132

ສູນຍົ່ນນຳມັຍ ທີ່ 6 ຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ໂທຣ. 0-4324-3210, 0-4333-7985

ສູນຍົ່ນນຳມັຍ ທີ່ 8 ຈັງຫວັດນໍາຈານສົງລວມ ໂທຣ. 0-5625-5451, 0-5632-5093-5



“ກາມ-ຕອບ” ເສັ້ນສູກຕ້ວຍນມແມ່ ພຸດກໍ່ 1



ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่	โทร. 0-5327-6856
ศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา	โทร. 0-7321-4200
โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี	โทร. 0-3652-1445-8, 0-3652-2507-11
โรงพยาบาลเจ้าพระยาภิมราชา สุพรรณบุรี	โทร. 0-3552-3394-95
โรงพยาบาลปักษ์ใต้ จันทบุรี	โทร. 0-3932-4975-84 ต่อ 3454 หรือ 1350
โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี	โทร. 0-3222-2836-55
โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม	โทร. 0-4374-0993
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น	โทร. 0-4333-7052
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสตินท์ขอนแก่น	โทร. 0-4334-8360-62
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์	โทร. 0-5541-1064
โรงพยาบาลมหาชัชนาครครีรัตน์ราชวราษฎร์	โทร. 0-7534-2016-17, 0-7534-2020
โรงพยาบาลพทสุง พทลุง	โทร. 0-7461-3008
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี	โทร. 0-3553-1077



ตอน เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล

27





ຖីសុខា មួនកិលប់ ឃប., គ.រ.(កុមារោ)
Master of Community Health (Nutrition)
Cert. Lactation Management Education (Wellstart)
ឯុទ្ធខ័ណ្ឌភាពទារាយ អង់គ្លេសការ
ការកិច្ចការកុមារវេជ្ជកាសទំនើប

ក្រសួងបណ្តុះបណ្តាល ឃប., គ.រ.(កុមារោ)
M.P.H. (Population and Family Health)
Cert. Lactation Management Education (Wellstart)
Cert. Breastfeeding : Practice and Policy Course (London)
គ្មានឈាន់បានដែលទទួលទៅពី 10 ឆ្នាំ

